

FICHA TÉCNICA



Nombre Comercial: Edo Micina 50

Antibiótico
Oxitetraciclina 5%

Función:

Antibiótico de amplio espectro y larga acción. Útil en el tratamiento de bacterias gram +, gram - y rickettsias.

Composición garantizada:

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:

Oxitetraciclina base (como Clorhidrato de Oxitetraciclina 54mg).....50mg

Excipientes c.s.p.....1 mL

Especies de uso:



Bovinos

Equinos

Porcinos

Ovinos

Caprinos

Perros

Gatos



Aves

No. de registro:

Registro ICA N° 2424-DB

Presentaciones del Producto:

500 mL

Dosis:

En casos de anaplasmosis bovina:

10 mg de oxitetraciclina/Kg de peso (equivalente a 20mL del producto por 100 Kg de peso), generalmente una sola dosis basta; en caso de ser necesario, repetir una sola vez a las 24 horas.

Para las otras indicaciones y especies: 5-10 mg/Kg, administrar cada 24 horas durante 3-5 días.

Vía de Administración / Modo de Uso:

Intramuscular, intravenosa y subcutánea.

Indicaciones:

En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, perros, aves (pollos, pollas) y gatos para el tratamiento de infecciones por *Anaplasma sp.*, *Rickettsia sp.*, *Streptococcus sp.*, *Escherichia coli*, *Pasteurella sp.*, *Haemophilus sp.*, *Leptospira sp.*, *Shigella sp.*, *Campylobacter sp.*, y *Listeria sp.*

Precauciones:

Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 7 días después de finalizado el mismo no debe darse para consumo humano.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Manténgase en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad.



Código de barras:

OXITETRACICLINA 5 %: 7707240052945

FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO
Noviembre 29 de 2018

